

レジメンcode:	C16-18
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	Ramucirumab+PTX
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
RAM	サイラムザ	8	mg/kg	点滴[*1]	d1、15
PTX	パクリタキセル(タキソール)	80	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、8、15

day1、15【ケモセーフ使用】

- | | | | | |
|-------------------|-------|----------------------|--------------|--------------|
| 1) ガスター | 20mg | 1 | A | |
| グラニセロン | 3mg | 1 | A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 | V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 | A | |
| ポララミン | 5mg | 1 | A | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15分 | |
| 2) サイラムザ | | 8 mg/kg | | インラインフィルター必須 |
| 生食 | 250ml | 全量250mLになるように生食調製 | | |
| | 主管② | 点滴 | 初回60分 | |
| | | | 2回目以降30分[*1] | |
| 3) 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 15分 | |
| 4) パクリタキセル(タキソール) | | 80 mg/m ² | | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 250ml | 1 | 袋 | |
| | 主管④ | 点滴 | 1時間 | インラインフィルター必須 |
| 5) 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | | | フラッシュ | |

〈所要時間 約2時間30分〉
 〈初回 約3時間〉

day8 【ケモセーフ使用】

1) ガスター	20mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
2) 生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
3) パクリタキセル(タキソール)		80 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
4) 生食	50ml	1 本		
			フラッシュ	

〈所要時間 約2時間〉

*蛋白尿があらわれることがあるので、本剤投与中は蛋白尿を定期的に検査すること(減量基準あり)

*infusion reactionがあらわれることあり

・grade3、4 → 本剤の投与を直ちに中止し、再投与しないこと

・grade1、2 → 投与速度を50%減速し、その後の全ての投与においても減速した投与速度で投与すること

*インラインフィルター使用必須