

レジメンcode:	C34-01
適応がん種:	小細胞肺癌
レジメン名:	CDDP+CPT-11
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPT-11	イリノテカン(トホ [®] テシ)	60	mg/m ²	点滴(90分)	d1、8、15
CDDP	シスプラチン(フリ [®] プラチ)	60	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

- 1) 硫酸Mg補正液 1 A
生食 500ml 1 袋
主管① 点滴 2時間
- 2) 生食 500ml 1 袋
主管② 点滴 2時間
- 3) アロカリス 235mg 1 V
パロノセトロン 0.75mg 1 V
デキサート 6.6mg 1 V
デキサート 3.3mg 1 A
ブスコパン 20mg 1 A
生食 50ml 1 本
主管③ 点滴 30 分
- 4) イリノテカン(トホ[®]テシ) 60 mg/m² 【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5% 500ml 1 袋
主管④ 点滴 90分
- 5) ラクテック 500ml 1 袋
主管⑤ 点滴 90 分
- 6) シスプラチン(フリ[®]プラチ) 60 mg/m² 【ケモセーフ使用】
生食 500ml 総液量650ml以下になるように生食を調製
主管⑥ 点滴 2時間
- 7) マンニトールS 300ml 1 袋
主管⑦ 点滴 1時間
- 8) ソルラクト 1L 1 袋
主管⑧ 点滴 3時間
- 9) ヘパリンNaロック 10ml 1 筒

ルートロック

〈所要時間 約14時間〉

次ページあり

day2、3

1) デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 硫酸Mg補正液		1 A
ソラクト	1L	1 袋
	主管②	点滴 4時間
3) ラクテック	500ml	1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒

ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

day8、15【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1 V
デキサート	6.6mg	1 V
デキサート	3.3mg	1 A
ブスコパン	20mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) イリノテカン(トポテンシ)		60 mg/m ² 【ケモセーフ使用】
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋
	主管②	点滴 90分
3) 生食	50ml	1 本

フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉