

レジメンcode:	C34-05
適応がん種:	小細胞肺癌
レジメン名:	CBDCA+VP-16
間隔:	3~4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VP-16	エトポシド	80~100	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~3
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1

day1【ケモセーフ使用】

1) アロカリス	235mg	1	V		
パロノセトロン	0.75mg	1	V		
デキサート	3.3mg	1.5	A		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	30分		
2) エトポシド		80~100	mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1	袋		
	主管②	点滴	2時間		
3) カルボプラチン(パラプラチン)		5	AUC		【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1	袋		
	主管③	点滴	1時間		
4) 生食	50ml	1	本		
				フラッシュ	
5) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約4時間〉

day2、3【ケモセーフ使用】

1) デキサート	3.3mg	1	A		
生食	50ml	1	本		
	主管①	点滴	15分		
2) エトポシド		80~100	mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1	袋		
	主管②	点滴	2時間		
3) 生食	50ml	1	本		
				フラッシュ	
4) ヘパリンNaロック	10ml	1	筒		
				ルートロック	

〈所要時間 約3時間〉