

レジメンcode:	C50-48
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	dose-denseAC
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
ADM	ドキソルビシン(アドリアシン)	60	mg/m ²	点滴(全開)	d1
CPA	エンドキサン	600	mg/m ²	点滴(1時間)	d1

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1【ケモセーフ使用】

1) アロカリス	235mg	1 V	
パロノセトン	0.75mg	1 V	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	30 分
2) ドキソルビシン(アドリアシン)		60 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	全開
3) エンドキサン		600 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋	
	主管③	点滴	1時間
4) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約2時間〉

【文献】

海外第Ⅲ相試験CALGB9741【JCO2003;21:1431(PMID:1266865)】

【適応】

周術期。リンパ節転移陽性やホルモン受容体陰性など、より再発リスクが高い場合に推奨される。

*持続型G-CSF製剤(ペグフィルグラスチム、ジースタボディーポッドなど)を併用する。

*4サイクル実施後、C50-02:wPTXへ移行する。