

|           |              |
|-----------|--------------|
| レジメンcode: | C56-28       |
| 適応がん種:    | 卵巣癌          |
| レジメン名:    | PLD+CBDCA+Bv |
| 間隔:       | 4週間          |

|    |
|----|
| 備考 |
|    |

| 略名    | 抗がん剤(採用薬品名)  | 投与量 | 単位                | 投与法         | 投与日   |
|-------|--------------|-----|-------------------|-------------|-------|
| PLD   | ドキシル         | 30  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(90分)*[1] | d1    |
| CBDCA | カルボプラチン      | 5   | AUC               | 点滴(1時間)     | d1    |
| Bv    | ベバシズマブ(アバスタ) | 10  | mg/kg             | 点滴*[2]      | d1、15 |

PLD:★総投与量 500mg/m<sup>2</sup>以下

\*PLD+CBDCA+Bv最大6コース投与後、C56-14:Bv維持療法へ移行する。

\*ドキシル

- ・\*[1]投与量が90mg以上の場合は、5%ブドウ糖500mlに溶解し120分で投与。
- ・インラインフィルター使用不可
- ・慎重投与:大豆アレルギーのある患者

#### day1【ケモセーフ使用】

|                   |           |     |                   |                |
|-------------------|-----------|-----|-------------------|----------------|
| 1) アロカリス          | 235mg     | 1   | V                 |                |
| パロノセトロン           | 0.75mg    | 1   | V                 |                |
| デキサート             | 3.3mg     | 1.5 | A                 |                |
| 生食                | 50ml      | 1   | 本                 |                |
|                   | 主管①       | 点滴  | 30分               |                |
| 2) ドキシル           |           | 30  | mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】      |
| ブドウ糖液5%           | 250ml*[1] | 1   | 袋                 |                |
|                   | 主管②       | 点滴  | 90分*[1]           | インラインフィルター使用不可 |
| 3) カルボプラチン(パラプラチ) |           | 5   | AUC               | 【ケモセーフ使用】      |
| 生食                | 250ml     | 1   | 袋                 |                |
|                   | 主管③       | 点滴  | 1時間               |                |
| 4) ベバシズマブ(アバスタ)   |           | 10  | mg/kg             |                |
| 生食                | 100ml     | 1   | 本                 |                |
|                   | 主管④       | 点滴  | 初回90分             |                |
|                   |           |     | 2回目60分            |                |
|                   |           |     | 3回目以降30分*[2]      |                |
| 5) 生食             | 50ml      | 1   | 本                 |                |

#### フラッシュ

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 投与量90mg未満の場合:〈所要時間 | 約4時間〉    |
| 〈2回目               | 約4時間30分〉 |
| 〈初回                | 約5時間〉    |

次ページあり

**day15**

---

|                 |       |          |              |
|-----------------|-------|----------|--------------|
| 1) 生食           | 50ml  | 1 本      |              |
| ルート確保           |       |          |              |
| <hr/>           |       |          |              |
| 2) ベバシズマブ(アバスタ) |       | 10 mg/kg |              |
| 生食              | 100ml | 1 本      |              |
|                 | 主管①   | 点滴       | 2回目60分       |
|                 |       |          | 3回目以降30分[*2] |
| <hr/>           |       |          |              |
| 3) 生食           | 50ml  | 1 本      |              |
| フラッシュ           |       |          |              |

---

〈所要時間 約1時間〉  
〈2回目 約1時間30分〉

**【文献】**

海外第Ⅲ相試験(AGO-OVAR2.21/ENGOT-OV18試験 Lancet Oncol 2020;21:699-709,PMID:32305099)