

|           |           |
|-----------|-----------|
| レジメンcode: | C56-29    |
| 適応がん種:    | 卵巣癌       |
| レジメン名:    | PLD+CBDCA |
| 間隔:       | 4週間       |

|    |
|----|
| 備考 |
|    |

| 略名    | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位                | 投与法        | 投与日 |
|-------|-------------|-----|-------------------|------------|-----|
| PLD   | ドキシル        | 30  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(90分)*1] | d1  |
| CBDCA | カルボプラチン     | 5   | AUC               | 点滴(1時間)    | d1  |

PLD:★総投与量 500mg/m<sup>2</sup>以下

\*ドキシル

- ・[\*1]投与量が90mg以上の場合は、5%ブドウ糖500ml に溶解し120分で投与。
- ・インラインフィルター使用不可
- ・慎重投与:大豆アレルギーのある患者

#### day1【ケモセーフ使用】

|                  |           |     |                   |                |
|------------------|-----------|-----|-------------------|----------------|
| 1) アロカリス         | 235mg     | 1   | V                 |                |
| パロノセトロン          | 0.75mg    | 1   | V                 |                |
| デキサート            | 3.3mg     | 1.5 | A                 |                |
| 生食               | 50ml      | 1   | 本                 |                |
|                  | 主管①       | 点滴  | 30 分              |                |
| 2) ドキシル          |           | 30  | mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】      |
| ブドウ糖液5%          | 250ml[*1] | 1   | 袋                 |                |
|                  |           | 90分 |                   |                |
|                  | 主管②       | 点滴  | [*1]              | インラインフィルター使用不可 |
| 3) カルボプラチン(パラプラチ |           | 5   | AUC               | 【ケモセーフ使用】      |
| 生食               | 250ml     | 1   | 袋                 |                |
|                  | 主管③       | 点滴  | 1時間               |                |
| 4) 生食            | 50ml      | 1   | 本                 |                |
|                  |           |     | フラッシュ             |                |

投与量90mg未満の場合:〈所要時間 約3時間30分〉

#### 【文献】

J Clin Oncol.28 (20):3323-9(2010):PMID:20498395