

レジメンcode:	C56-30
適応がん種:	卵巣癌
レジメン名:	3wPTX+Bv
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	175	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
Bv	ベバシズマブ(アバステン)	15	mg/kg	点滴[*1]	d1

day1 【ケモセーフ使用】

- | | | | | |
|-------------------|-------|-----|-------------------|--------------|
| 1) ガスター | 20mg | 1 | A | |
| デキサート | 6.6mg | 3 | V | |
| ポララミン | 5mg | 1 | A | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 | 分 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 | 分 |
| 3) パクリタキセル(タキソール) | | 175 | mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 | 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 3時間 | インラインフィルター必須 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 | 本 | |
| | 主管④ | 点滴 | 15 | 分 |
| 5) ベバシズマブ(アバステン) | | 15 | mg/kg | |
| 生食 | 100ml | 1 | 本 | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 初回90分 | |
| | | | 2回目60分 | |
| | | | 3回目以降30分[*1] | |
| 6) 生食 | 50ml | 1 | 本 | |

フラッシュ

- | | |
|-------|----------|
| 〈所要時間 | 約5時間〉 |
| 〈2回目 | 約5時間30分〉 |
| 〈初回 | 約6時間〉 |