

レジメンcode:	C80-04	備考
適応がん種:	神経内分泌細胞癌(小細胞癌)	
レジメン名:	NGT	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
NGT	ハイカムチン	1.0	mg/m ²	点滴(30分)	d1~5

day1~5【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
2) ハイカムチン		1.0 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本		
	主管②	点滴	30分	
3) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
4) 生食		10 ml		
				ルートロック

〈所要時間 約1時間〉

〈用量の変更に関する規定〉

- ・投与後、白血球数の最低値が1,000/mm³未満、又は血小板数の最低値が3万/mm³未満となった場合には、次コースの投与量を0.8mg/m²/日に減量する。
- ・投与後、白血球数の最低値が2,000/mm³以上及び血小板数の最低値が5万/mm³以上の場合には、次コースの投与量を1.2mg/m²/日に増量できる。

〈増減量の目安〉

増減量の段階	投与量
1段階増量	1.2mg/m ² /日
初回投与量	1.0mg/m ² /日
1段階減量	0.8mg/m ² /日

1.2mg/m²/日を超える用量で検討された本邦での小細胞肺癌での経験はない。

*腎機能に応じた減量基準あり。

クレアチニンクリアランス:20~39ml/分 → 初回投与量:0.5mg/m²

* 保険適応外(2024.7月時点)だが、倫理委員会(院長決裁)にて使用可能