

レジメンcode:	C85-03
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-CHOP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d2
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	50	mg/m ²	点滴(全開)	d2
VCR	オンコビン	1.4[*2]	mg/m ²	点滴(全開)	d2
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d2~6

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
ベポタスチンOD	10mg	1 錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
主管①	点滴		初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) 生食	50ml	1 本	フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	ルートロック

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
2) エンドキサン		750 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	【ケモセーフ使用】
3) ドキソルビシン(アドリアシン)		50 mg/m ²		
生食	50ml	1 本		
	主管③	点滴	全開	【ケモセーフ使用】
4) オンコピン		1.4 mg/m ²	最大2mg[*2]	
生食	50ml	1 本		
	主管④	点滴	全開	【ケモセーフ使用】
5) 生食	50ml	1 本		
			フラッシュ	

〈所要時間 約2時間30分〉

day2～6

1) プレドニゾロン		100 mg/body		
	内服	朝昼食後		