

レジメンcode:	C85-05	備考
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫	
レジメン名:	R-CHASE	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*]	d1
	デキサート	33	mg/body	点滴(30分)	d2～4
CPA	エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴(1時間)	d2
VP-16	エトポシド(ベプシド)	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d2～4
Ara-C	キロサイド[*1]	2000	mg/m ²	点滴(3時間)	d3、4

day1

1) カロナール	200mg	2錠	
ベポタスチンOD	10mg	1錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

[*1]

Ara-C投与前日から投与終了後2日間

1) 点眼・点鼻用リンデロンA液

点眼	1日6回
----	------

Ara-C終了3日目～9日目(7日間)

1) 点眼・点鼻用リンデロンA液

点眼	1日4回
----	------

day1

1) 生食	50ml	1本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*]
3) 生食	50ml	1本	フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1筒	ルートロック

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分 【ケモセーフ使用】
2) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) エンドキサン		1200 mg/m ²	
生食	250ml	1 袋	
	主管③	点滴	1時間
4) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管④	点滴	2時間
5) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約4時間30分〉

day3、4

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	2時間
4) キロサイド		2000 mg/m ²	
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管④	点滴	3時間
5) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約6時間30分〉

