レジメンcode:	C85-16
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	Bendamustine単剤
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	トリアキシシ	120	mg/m ²	点滴(1時間)	d1、2

day1【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	3.3mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15分	
2) トリアキシシ		120 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	調製後、6時間以内に投与を終了すること
3) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック
				〈所要時間 約2時間〉

day2【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	3.3mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15分	
2) トリアキシシ		120 mg/m ²		【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	調製後、6時間以内に投与を終了すること
3) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
				〈所要時間 約2時間〉