

|           |            |
|-----------|------------|
| レジメンcode: | C85-21     |
| 適応がん種:    | 非ホジキンリンパ腫  |
| レジメン名:    | R-miniCHOP |
| 間隔:       | 3週間        |

|    |
|----|
| 備考 |
|    |

| 略名  | 抗がん剤(採用薬品名)     | 投与量 | 単位                | 投与法     | 投与日  |
|-----|-----------------|-----|-------------------|---------|------|
|     | リツキシマブ(リツキサン)   | 375 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴[*1]  | d1   |
| CPA | エンドキサン          | 400 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(1時間) | d2   |
| ADM | ドキシソビシン(アドリアシン) | 25  | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(全開)  | d2   |
| VCR | オンコビン           | 1   | mg/body           | 点滴(全開)  | d2   |
| PSL | プレドニゾロン         | 40  | mg/m <sup>2</sup> | 内服      | d2~6 |

★ADM 総投与量 500mg/m<sup>2</sup>以下

day1

|          |       |     |              |
|----------|-------|-----|--------------|
| 1) カロナール | 200mg | 2 錠 |              |
| ベポタスチンOD | 10mg  | 1 錠 |              |
|          | 内服    |     | リツキシマブ投与30分前 |

day1

|                  |       |                       |                                                                           |
|------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1) 生食            | 50ml  | 1 本                   | 内服前投薬、心電図確認<br>ルート確保                                                      |
| 2) リツキシマブ(リツキサン) |       | 375 mg/m <sup>2</sup> |                                                                           |
| 生食               | 500ml |                       | 生食で10倍に希釈                                                                 |
| 主管①              | 点滴    |                       | 初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr<br>と1時間ごとに投与速度を上げる<br>2回目以降は100ml/hrから開始[*1] |
| 3) 生食            | 50ml  | 1 本                   | フラッシュ                                                                     |
| 4) ヘパリンNaロック     | 10ml  | 1 筒                   | ルートロック                                                                    |

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2【ケモセーフ使用】

|                    |       |                       |       |           |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|
| 1) グラニセトロン         | 3mg   | 1 A                   |       |           |
| 生食                 | 50ml  | 1 本                   |       |           |
|                    | 主管①   | 点滴                    | 15 分  |           |
| 2) エンドキサン          |       | 400 mg/m <sup>2</sup> |       |           |
| 生食                 | 250ml | 1 袋                   |       |           |
|                    | 主管②   | 点滴                    | 1時間   | 【ケモセーフ使用】 |
| 3) ドキソルビシン(アドリアシン) |       | 25 mg/m <sup>2</sup>  |       |           |
| 生食                 | 50ml  | 1 本                   |       |           |
|                    | 主管③   | 点滴                    | 全開    | 【ケモセーフ使用】 |
| 4) オンコビン           |       | 1 mg/body             |       |           |
| 生食                 | 50ml  | 1 本                   |       |           |
|                    | 主管④   | 点滴                    | 全開    | 【ケモセーフ使用】 |
| 5) 生食              | 50ml  | 1 本                   |       |           |
|                    |       |                       | フラッシュ |           |

〈所要時間 約2時間30分〉

day2～6

|            |    |                      |  |  |
|------------|----|----------------------|--|--|
| 1) プレドニゾロン |    | 40 mg/m <sup>2</sup> |  |  |
|            | 内服 | 朝昼食後                 |  |  |