

レジメンcode:	C85-26	備考
適応がん種:	悪性リンパ腫	
レジメン名:	R-GDP	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*]	d1
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8
	デキサート	33	mg/body	点滴(15分)	d1～4
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	75	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
ベポタスチンOD	10mg	1 錠	
	内服	リツキシマブ投与30分前	

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)	500ml	375 mg/m ²	生食で10倍に希釈
生食	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) 生食	500ml	1 本	
	主管②	2時間	
4) ホスアプレピタント	150mg	1 V	
生食	100ml	1 本	
	▶側管①	点滴	30分 主管②開始60分後から
5) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	5 V	
生食	50ml	1 本	
	▶側管②	点滴	15 分 側管①に続いて
6) ゲムシタビン		1000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本	
	主管③	点滴	30 分
7) シスプラチン(ブリプラチン)		75 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 本	
	主管④	点滴	2時間

8) マンニトールS	300ml	1 袋	
	主管⑤	点滴	1時間
9) 硫酸Mg補正液	20ml	1 A	
ソルラクト	1L	1 袋	
	主管⑥	点滴	3時間
10 ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
ルートロック			
〈所要時間 約13時間〉			

day2、3

1) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) 硫酸Mg補正液	20ml	1 A	
ラクテック	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
3) ラクテック	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
ルートロック			
〈所要時間 約5時間〉			

day4

1) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
〈所要時間 15分〉			

day8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) ゲムシタビン		1000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) 生食	50ml	1 本	
フラッシュ			
〈所要時間 約1時間〉			