レジメンcode:	C85-28	備考
適応がん種:	悪性リンパ腫	
レジメン名:	R-GCD	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8
	デキサート	[*2]	mg/body	点滴(15分) or 内服	d1~4
CBDDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d1

day1

1) カロナール	200mg	2錠	
ベポタスチンOD	10mg	1錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) パロノセトロン	0.75mg	1V	
デキサート	6.6mg	5V	
生食	50ml	1本	
	主管②	点滴	15分
4) ゲムシタビン		1000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1本	
	主管③	点滴	30分
5) カルボプラチン(パラプラチン)		5 AUC	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1本	
	主管④	点滴	1時間
6) 生食	50ml	1本	フラッシュ
7) ヘパリンNaロック	10ml	1筒	ルートロック

次ページあり

〈所要時間 約7時間〉

【*2】【内服の場合】

day2～4

1) デカドロン		40 mg/日
	内服	朝食後

【*2】【注射の場合】

day2、3

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分

2) 生食	50ml	1 本
-------	------	-----

フラッシュ

3) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
--------------	------	-----

ルートロック

〈所要時間 約30分〉

day4

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分

2) 生食	50ml	1 本
-------	------	-----

フラッシュ

〈所要時間 約30分〉

day8【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分

2) ゲムシタビン		1000 mg/m ² 【ケモセーフ使用】
-----------	--	----------------------------------

生食	100ml	1 本
----	-------	-----

	主管②	点滴 30 分
--	-----	---------

3) 生食	50ml	1 本
-------	------	-----

フラッシュ

〈所要時間 約1時間〉