

レジメンcode:	C85-39
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-CEOP(1日法)
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
VP-16	エトポシド(ペプシド)	50	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
VCR	オンコビン	1.4[*2]	mg/m ²	点滴(全開)	d1
PSL	プレドニゾン	100	mg/body	内服	d1~5
VP-16	ペプシド	100	mg/m ²	内服	d2,3

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
ベポタスチンOD	10mg	1 錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1~5

1) プレドニゾン		100 mg/body	
	内服		朝昼食後

day2,3

1) ペプシド		100 mg/m ²	
	内服		朝食後

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	15 分

次ページあり

4) エンドキサン		750 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
生食	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	
5) エトポシド(ベプシド)		50 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
生食	250ml	1 本		
	主管④	点滴	1時間	
6) オンコビン		1.4 mg/m ²	最大2mg[*2]	
生食	50ml	1 本	【ケモセーフ使用】	
	主管⑤	点滴	全開	
7) 生食	50ml	1 本		
			フラッシュ	

〈所要時間 約9時間〉