

レジメンcode:	C85-43
適応がん種:	悪性リンパ腫(中枢神経系原発)
レジメン名:	R-MPV
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
VCR	オンコビン	1.4[*2]	mg/m ²	点滴(全開)	d2
MTX	メソトレキセート[*2]	3500	mg/m ²	点滴(3時間)	d2
	プロカルバジン	100	mg/m ²	内服(朝食後)	d1~d7[*4]

[*3]day1~5

- | | |
|------------|--------------|
| 1) ダイアモックス | 250~500 mg/日 |
| | 内服 朝夕食後 |

*尿を経時的にチェックしpH7.0以上に維持すること。

*ダイアモックスは利尿及び尿のアルカリ化作用を有するので、ダイアモックス250~500mg/日をメソトレキセート投与前日から**レボホリナート**の救援投与終了まで経口又は静脈内投与すること。

*尿を酸性化する利尿剤(例えば、フロセミド、チアジド系利尿剤等)の使用を避けること

*メソトレキセートの血中濃度を経時的に測定すること。

メソトレキセートの血中濃度の危険限界は24時間値で 1×10^{-5} モル濃度、48時間値で 1×10^{-6} モル濃度、72時間値で 1×10^{-7} モル濃度であるので危険限界以上の濃度の際は**レボホリナート**の増量投与・**レボホリナート**救援投与の延長等の処置を行うこと。

→外注検査で結果確認が数日後となる為、24時間値のみ測定し**レボホリナート**救援投与の延長等を考慮する。

[*4]day1~7

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1) プロカルバジン | 100 mg/m ² |
| | 内服 朝食後 |

*奇数クールのみ内服

day1

- | | | | |
|----------|-------|-----|--------------|
| 1) カロナール | 200mg | 2 錠 | |
| ベポタスチンOD | 10mg | 1 錠 | |
| | 内服 | | リツキシマブ投与30分前 |

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保	
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²		
生食	500ml		生食で10倍に希釈	
	主管①	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]	
3) 生食	50ml	1 本		
	主管②		フラッシュ	
4) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管③	点滴	50ml/h翌日2:00まで投与、残破棄	
〈所要時間 ー〉				

day2【ケモセーフ使用】

1) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管①	点滴	8時間	(2:00)
2) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管②	点滴	8時間	(10:00)
3) ホスアプレピタント	150mg	1 V		
生食	100ml	1 本		
	▶側管①	点滴	30分	(10:00)
4) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管②	点滴	15分	(10:30)
5) オンコビン		1.4 mg/m ²	最大2mg[*2]	
生食	50ml	1 本	【ケモセーフ使用】	
	▶側管③	点滴	全開	(10:45)
6) メソトレキセート		3500 mg/m ²	【ケモセーフ使用】	
生食	500ml	全量500mlになるように生食を調製		
	▶側管④	点滴	3時間	(11:00)

7) 生食	50ml ▶側管⑤	1 本		フラッシュ
8) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管③	点滴	8時間	(18:00)
〈所要時間 ー〉				

day3

1) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管①	点滴	8時間	(2:00)
2) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管②	点滴	8時間	(10:00)
3) レボホリナート	25mg	7.5 mg		25mg/1vを生食5mlで溶解する。
生食	50ml	1 本		1.5mlにとって生食50mlボトルに戻す。
	▶側管①	点滴	15分	(11:00)
4) レボホリナート	25mg	7.5 mg		25mg/1vを生食5mlで溶解する。
生食	50ml	1 本		1.5mlにとって生食50mlボトルに戻す。
	▶側管②	点滴	15分	(17:00)
5) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管③	点滴	8時間	(18:00)
6) レボホリナート	25mg	7.5 mg		25mg/1vを生食5mlで溶解する。
生食	50ml	1 本		1.5mlにとって生食50mlボトルに戻す。
	▶側管③	点滴	15分	(23:00)
〈所要時間 ー〉				

day4

1) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管①	点滴	8時間	(2:00)
2) レボホリナート	25mg	7.5 mg	25mg/1vを生食5mlで溶解する。	
生食	50ml	1 本	1.5mlにとって生食50mlボトルに戻す。	
	▶側管①	点滴	15分	(5:00)
3) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管②	点滴	8時間	(10:00)
4) レボホリナート	25mg	7.5 mg	25mg/1vを生食5mlで溶解する。	
生食	50ml	1 本	1.5mlにとって生食50mlボトルに戻す。	
	▶側管②	点滴	15分	(11:00)
5) レボホリナート	25mg	7.5 mg	25mg/1vを生食5mlで溶解する。	
生食	50ml	1 本	1.5mlにとって生食50mlボトルに戻す。	
	▶側管③	点滴	15分	(17:00)
6) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管③	点滴	8時間	(18:00)
7) レボホリナート	25mg	7.5 mg	25mg/1vを生食5mlで溶解する。	
生食	50ml	1 本	1.5mlにとって生食50mlボトルに戻す。	
	▶側管④	点滴	15分	(23:00)

〈所要時間 ー〉

day5

1) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管①	点滴	8時間	(2:00)
2) レボホリナート	25mg	7.5 mg	25mg/1vを生食5mlで溶解する。	
生食	50ml	1 本	1.5mlにとって生食50mlボトルに戻す。	
	▶側管①	点滴	15分	(5:00)

〈所要時間 ー〉